

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-2-9-71 206873

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE LA RÉGION PARISIENNE

PARIS, HAUTS DE SEINE, SEINE-SAINT-DENIS, VAL-DE-MARNE, ESSONNE, VAL-D'OISE, YVELINES, SEINE-ET-MARNE

RÉGISSEUR RECETTES-AVANCE - D.D.A. PROTECTION DES VÉGÉTAUX, 47 Av. Paul-Doumer, (93) MONTREUIL-S-BOIS - 287 76-71

C. C. P. PARIS 9063-96

30 AOÛT 1971.

ABONNEMENT ANNUEL

25 F

BULLETIN N° 131

Supplément n° 1

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES.

CULTURES FRUITIÈRES

L'activité des papillons est restée relativement importante jusqu'au 25 août et des pontes ont été déposées. Des dégâts sont donc à craindre jusqu'aux 10-15 septembre :

- dans les vergers atteints en 1ère génération ou à proximité de ces derniers;
- principalement en situations urbaines et en secteurs chauds.

NOTE : dans les vergers attaqués par la Tordeuse de la pelure, utiliser un insecticide efficace contre les deux ravageurs.

D I V E R S.

- **TORDEUSE DE LA PELURE** : début des pontes de 2ème génération; les larves correspondantes peuvent, avant leur entrée en hibernation, provoquer de petites morsures sur les fruits. Ces attaques tardives sont limitées par les traitements contre le Carposcapse.
- **ACARIENS - PSYLLES** : populations plus ou moins importantes : tous les stades pour les Acariens (*P. ulmi* ou *T. urticae*), principalement larves et adultes pour les Psylles.
- **CARPOCAPSE DES PRUNES** : les éclosions larvaires les plus importantes sont terminées.
- **TAVELURES** : dans les plantations atteintes, maintenir la protection jusqu'à la récolte. Une sortie de taches devrait avoir lieu entre le 5 et le 10 septembre.

CULTURES LÉGUMIÈRES

- **TEIGNE DU POIREAU** : les attaques généralement faibles jusqu'à maintenant devraient se poursuivre pendant la 1ère quinzaine de septembre.
- **MILDIOU ET ALTERNARIOSE DE LA TOMATE** : pour lutter à la fois contre ces deux maladies, utiliser Mancozèbe et Manèbe : 160 g. , Propinèbe : 210 g. m.a./hl. Pour le Mildiou, une sortie de taches est à prévoir vers le début de la semaine prochaine si la pluie persiste.
- **SEPTORIOSE DU CELERI** : localement, extension de la maladie.

GRANDES CULTURES

- **DESINFECTION DES SEMENCES DE COLZA** :
- L'enrobage des semences avec le Lindane (40 g. de m.a./kg) permet la protection des jeunes plantes contre les Altises. Utiliser des produits à haute teneur en matière active. Toutefois, le traitement le plus efficace contre la Grosse Altise reste celui effectué lors de l'envahissement des cultures par une grande quantité d'adultes (seuil : 2 insectes au m²).
- contre les champignons responsables de la fonte des semis, peuvent être employés : le Thirame, le Manèbe, l'Oxyquinoléate de cuivre ou les organo-mercuriques.
- **MILDIOU DE LA POMME DE TERRE - CULTURES TARDIVES** : localement, sortie de taches récentes; nouvelle sortie à craindre entre le 5 et le 10.
- **CERCOSPORIOSE DE LA BETTERAVE** : Surveiller les cultures. N'intervenir qu'en cas de petits foyers et sur cultures à récolter tardivement.

V I G N E

VERS DE LA GRAPPE - MILDIOU - OIDIUM : Continuer à assurer la protection.

IMPORTANT : En toutes cultures, respecter scrupuleusement les délais d'emploi.

L'Ingénieur et le Technicien
chargés des Avertissements Agricoles,
H. SIMON et R. MERLING.

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux,
R. SARRAZIN.

Imprimerie de la Station de la Région Parisienne - Directeur-Gérant : L. BOUYX.
47, Av. Paul Doumer - 93- MONTREUIL-SOUS-BOIS.

P 264